Séries numériques

1 Calculs à la pelle

Exercice 1 (* → **)
Donner la nature de la série de terme général :

1) $\ln\left(\dfrac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)$.
2) $\dfrac{1}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$.
3) $n^{-\ln(\ln n)}$.
4) $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n$.
5) $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.
6) $\dfrac{1}{1^2+2^2+\cdots+n^2}$.
7) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}}$.
8) $\cos\left(\dfrac{1}{n}\right)-1$.

Exercice 2 (*)
Donner la nature de la série de terme général :

1) $\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)^n$.
2) $\dfrac{\ln(n)}{n!}$.
3) $\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{2i}{3}\right)^n$.
4) $\sin\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

Exercice 3 (*)
Donner la nature de la série de terme général :

1) $\ln\left(1+\mathrm{e}^{-n}\right)$.
2) $\dfrac{1}{n^{\mathrm{Arctan}(n)}}$.
3) $\dfrac{2^n+3^n}{n^2+\ln(n)+5^n}$.
4) $\left(\sin\left(\dfrac{1}{n}\right)\right)^n$.
5) $\dfrac{1+(-1)^n}{1+n}$.
6) $\dfrac{1+(-1)^n\sqrt{n}}{1+n}$.
7) $(-1))^n\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$.
8) $n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-\cos\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

Exercice 4
Pour $n\in\mathbf{N}$ et $x\in\mathbf{R}$, on pose $f_n(x)=\dfrac{n+2}{n+1}\,\mathrm{e}^{-nx^2}\cos(\sqrt{n}x)$.
Étudier la convergence de la série $\sum f_n(x)$ en fonction de x.

2 Méthode

Exercice 5 (*)
Montrer l'existence et calculer $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

Exercice 6 (**)
À l'aide de la comparaison série intégrale, donner un équivalent en $+\infty$ de

1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k^3$.
2) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}$.

Exercice 7 (Série harmonique)
On pose (H_n) la suite des sommes partielles associée à la série $\sum\limits_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}$.

1) À l'aide d'une comparaison série-intégrale, montrer que $H_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$.
2) Pour tout $n\in\mathbf{N}^*$, on pose $u_n=H_n-\ln(n)$. Montrer que $u_{n+1}-u_n=O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
3) En déduire qu'il existe $\gamma\in\mathbf{R}$ tel que $H_n=\ln(n)+\gamma+o(1)$.

3 Avec des intégrales

Exercice 8 (**)
Pour tout $n\in\mathbf{N}$, on pose

$$u_n=\int_0^1 x^n\,\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

1) Montrer que pour tout $n\in\mathbf{N}$, $\dfrac{1}{\mathrm{e}\,(n+1)}\leqslant u_n\leqslant\dfrac{1}{n+1}$.
2) Déterminer la nature des séries
$$\sum u_n,\ \sum\frac{u_n}{n}\ \text{et}\ \sum(-1)^n u_n.$$
3) Déterminer une relation de récurrence entre u_n et u_{n-1}.
4) En déduire que pour tout $n\in\mathbf{N}$ $u_n=\dfrac{n!}{\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}-\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\right)$.

4 Autour des séries alternées

Exercice 9 (**)

On propose de calculer explicitement $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

Pour tout $x \in [0, 1]$, pour tout $N \in \mathbf{N}$, on pose $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$.

1) Justifier que S est bien défini.

2) Déterminer une expression simple de S_N en fonction d'une intégrale.

3) En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.
On évitera de passer à la limite « sous l'intégrale ».

Exercice 10 (**)

Suite de l'exercice précédent : une autre méthode.

Pour tout $N \in \mathbf{N}$, on pose $S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.
On rappelle que (S_N) est convergente (exercice précédent).
On rappelle également le résultat prouvé avec les suites :

$$H_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} = \ln(N) + \gamma + o(1)$$

avec $\gamma \in \mathbf{R}$, la constante d'Euler.

1) Exprimer S_{2N} en fonction de H_N et H_{2N}.

2) En déduire la limite de S_N quand N tend vers $+\infty$.

On a encore une autre méthode avec le chapitre d'intégration.

Exercice 11 (***)

Pour tout $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.
On définit φ sur $\mathbf{N}^*$ par

$$\forall n \in \mathbf{N}^*,\ \varphi(3n-2) = 2n-1,\ \varphi(3n-1) = 4n-2 \text{ et } \varphi(3n) = 4n.$$

1) Montrer que φ est une permutation de $\mathbf{N}^*$.

2) Justifier l'existence de la somme et calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_{\varphi(n)}$.

Exercice 12 (**)

1) Montrer que $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ converge.

2) Donner une suite $(u_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ telle que

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

et $\sum u_n$ diverge.

5 Exercices théoriques

Exercice 13 (*)
Montrer que si $\sum (u_n + v_n)$ converge, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Exercice 14 (*)
Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}} \in \mathbf{Z}^{\mathbf{N}}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur u pour que $\sum u_k$ converge.

Exercice 15 (*)
Soit (u_n) une suite réelle strictement positive.
Montrer que la série $\sum \ln\left(\frac{u_{k+1}}{u_k}\right)$ converge si et seulement si la suite (u_n) converge vers une limite strictement positive.

Exercice 16 (*)
Donner un exemple d'une suite (u_n) positive non monotone telle que $\sum u_n$ converge.

Exercice 17 (**)
Montrer que si $\sum u_n$ est absolument convergente, alors $\sum u_n^2$ aussi.

Exercice 18 (**)
Soient (a_n) et (b_n) deux suites positives.

1) On suppose que $a_n = o(b_n)$.

   (a) Si $\sum b_n$ converge, montrer que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} b_k\right)$.

   (b) Si $\sum b_n$ diverge, montrer que $\sum_{k=1}^{n} a_k = o\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right)$.

2) Faire de même pour les suites équivalentes.

Exercice 19 (***)
Soit u une suite strictement positive. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on pose $a_n = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.
Montrer que si (a_n) bornée, alors il existe $s = \sup\{\text{valeurs d'adhérence de } a\}$ dans $\mathbf{R}_+$.

Montrer alors que pour $s \in [0, 1[$, $\sum u_n$ converge.

6 Familles sommables

Exercice 20 (*)
Soit $q \in \mathbf{C}$ avec $|q| < 1$.
Montrer que la famille $\left(q^{|n|}\right)_{n\in\mathbf{Z}}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 21 (*)
Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{k!}.$$

Exercice 22 (**)

1) Soit $p \geqslant 1$, montrer que

$$\sum_{n=1,\, n\neq p}^{+\infty}\frac{1}{n^2-p^2} = \frac{3}{4p^2}.$$

2) Calculer $\sum\limits_{p=1}^{+\infty}\sum\limits_{n=1,\, n\neq p}^{+\infty}\frac{1}{n^2-p^2}$ et comparer avec $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\sum\limits_{p=1,\, n\neq p}^{+\infty}\frac{1}{n^2-p^2}$.
Que peut-on en déduire.

Exercice 23 (**)
Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n)x^n$$

où $d(n)$ désigne le nombre de diviseurs positifs de n.

Exercice 24 (*) (Mines)
Pour $k \geqslant 2$, on note $\zeta(k) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^k}$.
Étudier la convergence des séries $\sum\limits_{k\geqslant 2}(\zeta(k)-1)$ et $\sum\limits_{k\geqslant 2}(-1)^k(\zeta(k)-1)$ et calculer leur somme.

7 Entraînement

Exercice 25 (**)
Déterminer la nature de la série

$$\sum \frac{(-1)^n}{\ln(\sqrt{n}+1)}.$$

Exercice 26 (**)
Soit u une suite décroissante telle que $\sum u_n$ converge.

1) Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on note $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$.
En considérant $S_{2n} - S_n$, montrer que $u_{2n} = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

2) Montrer que $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

3) Le résultat est-il toujours vrai si u n'est pas supposée décroissante ?

Exercice 27 (**) (Séries de Bertrand)
Soient α et β deux réels. On appelle série de Bertrand, la série

$$\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n^\alpha(\ln n)^\beta}.$$

Étudier la nature de cette série.

Exercice 28 (***)

1) Soit u une suite réelle positive.
Montrer que si $\left(\sum\limits_{k=1}^{n^2-1} u_k\right)$ converge, alors la série $\sum u_k$ converge.

2) S'il y a convergence, calculer $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{\lfloor\sqrt{k+1}\rfloor - \lfloor\sqrt{k}\rfloor}{k}$.

Exercice 29 (***)

1) Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite réelle décroissante, positive.
On pose $\forall n \in \mathbf{N}, \quad v_n = 2^n u_{2^n}$.
Montrer que

$$\sum u_n \text{ converge si et seulement si } \sum v_n \text{ converge.}$$

2) Application : étudier la convergence des séries $\sum \frac{1}{n \ln n}$ et $\sum \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$.

3) *Généralisation :* Soient $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite réelle décroissante, positive et $p \in \mathbf{N}$ tel que $p \geqslant 2$.
On pose $\forall n \in \mathbf{N}, \quad v_n = p^n u_{p^n}$.
Montrer que

$$\sum u_n \text{ converge si, et seulement si } \sum v_n \text{ converge.}$$

Exercice 30 (***)

Soit $f \in \mathscr{C}^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}_+^*)$ telle que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f'(x)}{f(x)} = -\infty$.

1) Montrer que la série de terme général $f(n)$ converge.

2) Donner un équivalent du reste $R_{n_0-1} = \sum\limits_{k=n_0}^{+\infty} f(k)$.

Exercice 31 (***)

Pour $x \in \mathbf{R}$, on pose $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2 + x^2}$ sous réserve de convergence.

1) Déterminer le domaine de définition de f.

2) Trouver un équivalent de $f(x)$ quand $x \to +\infty$?

Exercice 32 (***)

Soit (a_n) une suite bornée telle que

$$\forall p \geqslant 2, \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^p} = 0.$$

Montrer que (a_n) est la suite nulle.

Exercice 33

Soit σ une bijection de $\mathbf{N}^*$ dans lui-même. Déterminer la nature de :

1) (*) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{\sigma(n)^2}$.

2) (**) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{\sigma(n)}$.

3) (***) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n\sigma(n)}$.

4) (***) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{\sigma(n)}{n^2}$.

Exercice 34 (***)

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On veut montrer que $\sum\limits_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p}$ diverge.

Par l'absurde, on suppose qu'elle converge.
On écrit les nombres premiers par ordre croissant $(p_i)_{i\in\mathbf{N}}$.

1) Montrer qu'il existe $k \in \mathbf{N}$, tel que

$$\sum_{i=k+1}^{+\infty} \frac{1}{p_i} < \frac{1}{2}.$$

2) Soit $N \in \mathbf{N}^*$, on note $N_s = \text{Card}\ \{n \in [\![1, N]\!], \exists p_i \geqslant k+1, p_i | n\}$ et $N_i = N - N_s$. Montrer que $N_s < \frac{N}{2}$.

3) Montrer que $N_i \leqslant 2^k \sqrt{N}$. *Pour $n \in [\![1, N]\!]$ tel que $\forall i \geqslant k+1$, $p_i \not| n$, on pourra noter $n = a_n b_n^2$, avec a_n le facteur sans carrés dans la décomposition en facteurs premiers.*

4) Conclure.

Preuve due à Erdòs.

8 Exercices CCINP

Exercice 35 (CCINP 5)

1) On considère la série de terme général $u_n = \dfrac{1}{n\,(\ln n)^\alpha}$ où $n \geqslant 2$ et $\alpha \in \mathbf{R}$.

   (a) **Cas $\alpha \leqslant 0$**

   En utilisant une minoration très simple de u_n, démontrer que la série diverge.

   (b) **Cas $\alpha > 0$**

   Étudier la nature de la série.
   Indication: on pourra utiliser la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

2) Déterminer la nature de la série $\sum\limits_{n\geqslant 2} \dfrac{\left(\mathrm{e} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right) \mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{\left(\ln(n^2+n)\right)^2}$.

Exercice 36 (CCINP 6)
Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite de réels strictement positifs et ℓ un réel positif strictement inférieur à 1.

1) Démontrer que si $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\ell$, alors la série $\sum u_n$ converge.

Indication: écrire, judicieusement, la définition de $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\ell$, puis majorer, pour n assez grand, u_n par le terme général d'une suite géométrique.

2) Quelle est la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\frac{n!}{n^n}$?

Exercice 37 (CCINP 7)

1) Soient $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbf{N}}$ deux suites réelles telles que $(v_n)_{n\in\mathbf{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang.

   (a) Prouver que si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.

   (b) Dans cette question on suppose que (v_n) est positive.
   Prouver que : $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n \Rightarrow \sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

2) Étudier la convergence de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2}\frac{((-1)^n+\mathrm{i})\sin\left(\dfrac{1}{n}\right)\ln n}{\left(\sqrt{n+3}-1\right)}$.

Remarque : i désigne le nombre complexe de carré égal à -1.

Exercice 38 (CCINP 8 - simplifié)

1) Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite décroissante positive de limite nulle.

   (a) Démontrer que la série $\sum (-1)^k u_k$ est convergente.

   (b) Donner une majoration de la valeur absolue du reste de la série $\sum (-1)^k u_k$.

2) On pose : $\forall n\in\mathbf{N}^*$, $\forall x\in\mathbf{R}$, $f_n(x)=\dfrac{(-1)^n\,\mathrm{e}^{-nx}}{n}$.

   Étudier la convergence de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f_n(x)$ en fonction de x.

Exercice 39 (CCINP 17-extrait)
On pose:

$$\forall\, n\in\mathbf{N},\ \forall x\in\mathbf{R},\ f_n(x)=nx^2\,\mathrm{e}^{-x\sqrt{n}}.$$

Déterminer les valeurs de $x\in\mathbf{R}$ pour lesquelles la série $\sum f_n(x)$ converge.

Exercice 40 (CCINP 46)
On considère la série: $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$.

1) Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi\sqrt{n^2+n+1}=n\pi+\dfrac{\pi}{2}+\alpha\dfrac{\pi}{n}+O\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ où α est un réel que l'on déterminera.

2) En déduire que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge.

3) $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge-t-elle absolument ?