

LOGIQUE ET RAISONNEMENT

1 POUR COMMENCER...

Exercice 1 (*)

Soit f une application définie sur \mathbf{R} .

Dire pour chaque situation si les deux assertions ont la même signification ou non. Expliquer.

- 1) « $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = 0$ » et « $\forall z \in \mathbf{R}, f(z) = 0$ ».
- 2) « $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = 0$ » et « $\exists x \in \mathbf{R}, f(x) = 0$ ».
- 3) « Les éléments sont non tous nuls » et « les éléments sont tous non nuls ».

Exercice 2 (*)

Donner la valeur de vérité des assertions

- 1) « $\frac{1}{x} \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$ ».
- 2) « $x \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{x} \geq 0$ ».
- 3) « $x \mapsto \cos x$ est croissante sur $\mathbf{R} \iff \mathbf{Z}$ est un sous-ensemble de \mathbf{N} ».
- 4) « (u_n) n'est pas croissante $\Rightarrow (u_n)$ est décroissante ».
- 5) « $(\forall x \in \mathbf{R}, \exists \lambda \in \mathbf{R}, \text{ tel que } f(x) = \lambda x) \iff f$ est une fonction linéaire ».

Exercice 3 (*)

Compléter avec \Rightarrow , \iff ou \Leftarrow .

$ABCD$ est un carré	$ABCD$ est un parallélogramme
$a > 1$	$\frac{1}{a} < 1$
$AB = AC$	ABC est isocèle
$\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, y < x$	$\exists y \in \mathbf{R}, \forall x \in \mathbf{R}, y < x$
$\ln a = b$	$a = e^b$
$x > 2$	$x^2 > 4$
A, B alignés et B, C alignés	A, B, C alignés.
$x > 0$	$-x \leq 0$
f est continue	f est dérivable

Exercice 4 (*)

- 1) Quelle est la contraposée de :
« si un nombre est divisible par 6, alors il est pair » ?
- 2) Quelle est la réciproque du théorème :
« Si un nombre entier est multiple de 10 alors son chiffre des unités est 0 ».
- 3) Quelle est la contraposée du théorème :
« Si un nombre entier est multiple de 10 alors son chiffre des unités est 0 ».

2 LECTURE DES QUANTIFICATEURS

Exercice 5 (**)

Ces propositions sont-elles vraies ?

- 1) $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbf{R}_+, a < \varepsilon$.
- 2) $e^a > 0 \Rightarrow a > 0$.
- 3) $a > 0 \Rightarrow e^a > 0$.
- 4) $e^a < 0 \Rightarrow a < 0$.
- 5) Si f est une fonction $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, alors $\forall y \in \mathbf{R}, \exists x \in \mathbf{R}, f(x) = y$.
- 6) Si f est une fonction $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, alors $\exists y \in \mathbf{R}, \forall x \in \mathbf{R}, f(x) = y$.
- 7) Si f est une fonction $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, alors $\exists x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, f(x) = y$.
- 8) Si f est une fonction $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, alors $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, f(x) = y$.

Exercice 6 (**)

Existe-t-il une fonction f sur \mathbf{R} , vérifiant

$$\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, f(y) > f(x).$$

Exercice 7 (**)

Donner la signification des propositions :

- 1) $\forall x \in \mathbf{R}, \exists M \in \mathbf{R}, f(x) \leq M$.
- 2) $\forall n \in \mathbf{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
- 3) $\forall A \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}, u_n > A$.
- 4) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbf{N}, \forall n \geq n_\varepsilon, |u_n| \leq \varepsilon$.

3 ÉCRITURE AVEC LES QUANTIFICATEURS

Exercice 8 (*)

Écrire les propositions suivantes avec des quantificateurs :

- 1) La fonction f est majorée sur \mathbf{R} .
- 2) La fonction f n'est pas majorée sur \mathbf{R} .
- 3) La fonction f ne s'annule pas sur \mathbf{R} .
- 4) La fonction f s'annule sur \mathbf{R} .
- 5) La fonction f est nulle sur \mathbf{R} .
- 6) La fonction f s'annule une unique fois sur \mathbf{R} .

Exercice 9 (*)

Écrire les propositions suivantes avec des quantificateurs :

- 1) Aucun entier n'est supérieur à tous les autres,
- 2) Entre deux nombres rationnels distincts, il existe toujours un nombre irrationnel.
- 3) Étant donnés trois réels, il en existe au moins deux de même signe.
- 4) Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
- 5) La fonction f est supérieure ou égale à la fonction $x \mapsto x^2$ sur \mathbf{R} .

4 NÉGATION

Exercice 10 (**)

Donner la négation (avec les quantificateurs) des propositions de l'exercice 7.

Exercice 11 (**)

Donner la négation des assertions :

- 1) $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, f(x) > y$.
- 2) $\forall x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x > y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- 3) $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x > y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- 4) $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, x > y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

5 CONSTRUIRE UN RAISONNEMENT

Exercice 12 (**)

Montrer que

- 1) Pour $n \in \mathbf{N}$, si n^2 est impair, alors n est impair.
- 2) Pour $a \in \mathbf{R}$, si a^2 n'est pas un multiple entier de 16, alors $\frac{a}{2}$ n'est pas un entier pair.
- 3) Pour $a \in \mathbf{R}$, si $\forall \varepsilon > 0, a \leq \varepsilon$ alors $a \leq 0$.

Exercice 13 (*)

Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$,

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exercice 14 (**)

a et b désignent deux nombres réels.

- 1) Montrer que si $a + b > 1$, alors $a > \frac{1}{2}$ ou $b > \frac{1}{2}$.
- 2) Est-il vrai que si $ab > 1$, alors $a > 1$ ou $b > 1$?

Exercice 15 (**)

Trouver toutes les fonctions f qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \exists \lambda \in \mathbf{R}, \text{ tel que } f(x) = \lambda x.$$

Exercice 16 (**)

Soit $n \in \mathbf{N}$, démontrer que $10^n - (-1)^n$ est divisible par 11.

Exercice 17 (**)

Montrer qu'il existe une unique fonction $f : \mathbf{R} \mapsto \mathbf{R}$ telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2, f(y - f(x)) = 2 - x - y.$$

Donner son expression.

6 POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 18 (*)

Montrer que :

$$\forall x \in \mathbf{R}, |x - 2| < x^2 - 2x + 3.$$

Exercice 19 (**)

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et soient $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbf{R}_+)^n$. Montrer que

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n > M \quad \Rightarrow \quad \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\} > \frac{M}{n}.$$

Soigner la rédaction.

Exercice 20 (***)

On définit le logarithme décimal de x : $\log(x)$ comme l'unique y tel que $10^y = x$.

Montrer que $\log 2 \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$.

Exercice 21 (***)

Existe-t-il une fonction $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbf{N}^2, (f(x))^{f(y)} = y^x.$$

Exercice 22 (***)

On considère une suite (u_n) sous-additive, c'est-à-dire telle que

$$\forall (i, j) \in (\mathbf{N}^*)^2, u_{i+j} \leq u_i + u_j.$$

1) Montrer que

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, u_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{k}.$$

2) Trouver une suite sous-additive qui vérifie le cas d'égalité :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{k}.$$

3) En déduire que $\forall n \in \mathbf{N}^*$,

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Exercice 23 (***)

- 1) Démontrer que si on range $(n + 1)$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.
- 2) On considère 3 nombres pris dans l'intervalle $]0, 1[$. Montrer qu'il en existe au moins 2 notés a, b tels que $|b - a| < \frac{1}{2}$.
- 3) On considère un carré de côté 1 contenant 51 points. Montrer qu'il existe au moins 3 points situés à une distance inférieure à $\frac{2}{7}$.

Exercice 24 (***)

Montrer qu'il existe une unique application $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ telle que

$$\forall n \in \mathbf{N}, f(n + 1) > f(f(n)).$$

*Indication en note de bas de page*¹

¹Pour une fonction f solution, on pourra commencer par chercher l'ensemble des k tels que $f(k) = \min\{f(n), n \in \mathbf{N}\}$. Ce n'est que la première étape du raisonnement.