

# LES NOMBRES RÉELS

## 1 RÉOLUTION D'ÉQUATIONS ET INÉGALITÉS

D'autres exercices sur les inégalités se trouvent dans la partie soutien du site, ne pas hésiter à s'y référer.

### Exercice 1 (\*)

Résoudre et représenter graphiquement les solutions des inégalités suivantes :

$$1) (x-2)(x-1) < 0.$$

$$2) \frac{x+3}{x-5} < 0.$$

$$3) \frac{x+3}{x-5} < 1.$$

$$4) x < \frac{1}{x}.$$

### Exercice 2 (\*)

Résoudre les inégalités suivantes :

$$1) -x^3 + 2x^2 \geq 0.$$

$$2) 2x^2 - 4x - 6 \geq 0.$$

$$3) x^3 + 5x^2 + 8x + 6 < 2.$$

$$4) x^3 + x^2 - 5x - 5 \leq 0.$$

### Exercice 3 (\*)

Résoudre les inégalités suivantes :

$$1) |x-5| < 2.$$

$$2) |x+1| > 3.$$

$$3) \frac{1+x}{1-x} < |x-1|.$$

### Exercice 4 (\*\*)

Résoudre les égalités suivantes :

$$1) x|x| = 3x + 2.$$

$$2) |x+2| + |3x-1| = 4.$$

$$3) |x^2 + x - 3| = |x|.$$

$$4) x + |x| = \frac{2}{x}.$$

### Exercice 5 (\*)

1) Montrer que pour tout  $x > -1$ ,  $\ln(1+x) \leq x$ .

2) En déduire que pour tout  $x > 0$ ,

$$0 \leq \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}.$$

### Exercice 6 (\*\*)

Résoudre les égalités suivantes :

$$1) \ln((x+2)(x-1)) = \ln 2.$$

$$2) x + \sqrt{2x+1} = 1.$$

## 2 RELATIONS BINAIRES

### Exercice 7 (\*)

Donner la liste de

1) toutes les relations d'équivalence sur  $E = \{1, 2, 3\}$ .

2) toutes les relations d'ordre sur  $E = \{1, 2\}$ .

### Exercice 8 (\*\*) (lecture du cours)

Répondre en justifiant.

1) Une relation binaire peut-elle être à la fois symétrique et antisymétrique ?

2) Une relation binaire peut-elle n'être ni symétrique, ni antisymétrique ?

3) Soit  $E$  un ensemble non vide muni d'une relation d'ordre  $\preccurlyeq$ .

Peut-il exister une suite d'éléments  $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$  deux à deux distincts de  $E$  formant une boucle d'inégalités :

$$x_1 \preccurlyeq x_2 \preccurlyeq \dots \preccurlyeq x_n \preccurlyeq x_1 ?$$

4) Soit  $E$  un ensemble non vide muni d'une relation  $\prec$  antisymétrique et transitive. Est-ce nécessairement une relation d'ordre stricte ?

Dans ce cas, y-a-t-il unicité de la relation d'ordre « large » qui lui est associée ?

5) On considère une partition d'un ensemble non vide  $E$ .

Montrer qu'il existe une relation d'équivalence sur  $E$  telle que cette partition correspondent aux classes d'équivalence de cette partition.

6) Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'une relation d'équivalence sur  $E$  soit totale.

### Exercice 9 (\*)

On note  $E = \mathbf{Z} \times \mathbf{N}^*$  et on munit  $E$  de la relation binaire définie par

$$\forall((a, b), (c, d)) \in E^2, (a, b) \mathcal{R} (c, d) \iff ad = bc.$$

1) Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $E$ .

2) Décrire la classe d'équivalence de  $(a, b) \in E$ .

**Exercice 10 (\*)**

On définit la relation  $\mathcal{R}$  sur  $\mathcal{P}(E)$  par

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2, A\mathcal{R}B \iff A = B \text{ ou } A = \overline{B}.$$

Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.

**Exercice 11 (\*\*)**

On définit la relation  $\mathcal{R}$  sur  $\mathbf{R}$  par

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2, x\mathcal{R}y \iff xe^y = ye^x.$$

- 1) Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.
- 2) Pour  $x \in \mathbf{R}$ , déterminer le nombre d'éléments de la classe de  $x$  modulo  $\mathcal{R}$ .

**Exercice 12 (\*\*)**

Étudier la relation  $\mathcal{R}$  définie sur  $\mathbf{R}$  par

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2, x\mathcal{R}y \iff \exists n \in \mathbf{N}^*, y = x^n.$$

**3 MAJORANTS-MINORANTS**

**Exercice 13 (\*)**

- 1) La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est-elle majorée sur  $\mathbf{R}_+^*$ , est-elle minorée sur ce même intervalle ?
- 2) Donner sa borne inférieure en justifiant. Est-ce un minimum ?

**Exercice 14 (\*)**

$$E = \{1 - (-1)^n, n \in \mathbf{N}\}.$$

- 1) L'ensemble est-il majoré ? minoré ?
- 2) S'il est majoré, donner sa borne supérieure, est-ce un maximum ?
- 3) S'il est minoré, donner sa borne inférieure, est-ce un minimum ?

**Exercice 15 (\*)**

$$E = \left\{ \frac{2n-1}{n}, n \in \mathbf{N}^* \right\}.$$

- 1) L'ensemble est-il majoré ? minoré ?
- 2) S'il est majoré, donner sa borne supérieure, est-ce un maximum ?
- 3) S'il est minoré, donner sa borne inférieure, est-ce un minimum ?

**Exercice 16 (\*)**

On considère les fonctions  $a$  et  $b$  définies sur  $\mathbf{R}$  par:

$$a(x) = \begin{cases} 2-x & \text{si } x \geq 3 \\ x^2 & \text{si } x < 3 \end{cases} \quad \text{et} \quad b(x) = \begin{cases} 1+1/x & \text{si } x > 0 \\ \sqrt{-x} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

- 1) Les fonctions sont-elles majorées ? minorées ?
- 2) Si elles sont majorées, donner leur borne supérieure, est-ce un maximum ?
- 3) Si elles sont minorées, donner leur borne inférieure, est-ce un minimum ?

**Exercice 17 (\*\*)**

On définit la suite  $(u_n)$  par  $u_0 = 1$  et

$$\forall n \in \mathbf{N}, 3u_{n+1} + 2u_n + 1 = 0.$$

Déterminer si la suite est majorée, minorée.  
Déterminer, en cas d'existence  $\sup \{u_n, n \in \mathbf{N}\}$  et  $\inf \{u_n, n \in \mathbf{N}\}$ .

**4 PARTIE ENTIÈRE**

**Exercice 18 (\*\*)**

Démontrer que  $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$ ,

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

**Exercice 19 (\*\*) (méthode)**

Démontrer que  $\forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*$ ,

$$0 \leq \lfloor nx \rfloor - n\lfloor x \rfloor \leq n - 1.$$

**Exercice 20 (\*\*)**

Démontrer que  $\forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*, \left\lfloor \frac{1}{n} \lfloor nx \rfloor \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$ .

**Exercice 21 (\*)**

Résoudre l'équation  $\left\lfloor \frac{x}{1-3x} \right\rfloor = 2$ .

**Exercice 22 (\*\*)**

Résoudre sur  $\mathbf{R}$

$$\lfloor 2x - 1 \rfloor = \lfloor x + 1 \rfloor.$$

**Exercice 23 (\*\*\*)**

Soit  $a$  un réel fixé.

- 1) Montrer que pour tous réels  $x$ ,  $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$ .
- 2) Montrer que pour tout  $k \in \mathbf{N}$ ,  $\left\lfloor \frac{a+2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{a}{2^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{2^{k+1}} \right\rfloor$ .
- 3) En déduire, pour tout entier  $n$ , une expression simplifiée de  $u_n = \sum_{k=0}^n \left\lfloor \frac{a+2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor$ .

**5 INÉGALITÉS PLUS SOPHISTIQUÉES****Exercice 24 (\*)**

Démontrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ ,

$$\min(x, y) = \frac{(x+y) - |x-y|}{2} \quad \text{et} \quad \max(x, y) = \frac{(x+y) + |x-y|}{2}.$$

**Exercice 25 (\*\*)**

- 1) Résoudre dans  $\mathbf{R}$ , l'inéquation suivante :  $x^2 - x - 1 \geq 0$ .
- 2) Résoudre dans  $\mathbf{R}$ , la chaîne d'inéquations suivantes :

$$1 + x - x^2 \leq x^2 - 3x + 1 \leq x^2 - x - 1.$$

- 3) Résoudre dans  $\mathbf{R}$ , l'inéquation :

$$|x^2 - 3x + 1| \leq x^2 - x - 1.$$

**Exercice 26 (\*\*)**

Soit  $n \geq 1$ .

On considère  $(a_i)_{i \in [1, n]} \in (\mathbf{R}_+^*)^n$ , et on se propose de comparer leurs moyennes harmonique  $H$ , géométrique  $G$  et arithmétique  $A$ .

Elles sont définies par

$$H = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}, \quad G = \left( \prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{et} \quad A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i.$$

- 1) Montrer que pour  $n \in \{1, 2\}$ ,

$$G \leq A.$$

- 2) En déduire que pour tout  $n$  puissance de 2,  $G \leq A$ .

- 3) Soit  $n \in \mathbf{N}^*$ . Il existe  $p \in \mathbf{N}$  tel que  $n \leq 2^p$ .

On complète la famille  $(a_1, \dots, a_n)$  par la valeur  $A$  autant de fois que nécessaire pour obtenir un  $2^p$ -uplet.

Montrer que cela permet de prouver que  $G \leq A$  au rang  $n$ .

- 4) Prouver que  $H \leq G$ .

**Exercice 27 (\*\*)**

On définit  $f$  sur  $\mathbf{R}_+$  par

$$f : x \mapsto \sup_{n \in \mathbf{N}} \frac{x^n}{n!}.$$

Montrer que  $f$  est bien définie sur  $\mathbf{R}_+$  et donner son expression sans utiliser les bornes supérieures (ou inférieures).

**Exercice 28 (\*\*)**

- 1) (\*) Montrer que  $\forall x \in [0, 1]$ ,  $0 \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ .

**Retenir cette inégalité et la méthode.**

- 2) En déduire que  $\forall (a, b, c) \in [0, 1]^3$ ,

$$\min(a(1-b), b(1-c), c(1-a)) \leq \frac{1}{4}.$$

**Exercice 29 (\*\*)**

- 1) Soient  $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ , montrer que  $(x+y)^2 \geq 4xy$ .

- 2) En déduire que

$$\forall (a, b, c) \in (\mathbf{R}_+)^3, (a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc.$$

- 3) En déduire que

$$\forall (a, b, c) \in (\mathbf{R}_+^*)^3, (a+b+c) \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

**Exercice 30 (\*\*\*)**

Montrer que pour tout  $n \geq 3$ ,

$$\sqrt{n} < \sqrt[n]{n!}.$$

**6 APPROFONDISSEMENT**

**Exercice 31 (\*\*\*) (Min-max ou max-min ?)**

- 1) Soit  $(n, p) \in (\mathbf{N}^*)^2$ .  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , on définit  $a_{i,j} \in \mathbf{R}$ .  
Démontrer que

$$\min_{1 \leq i \leq n} \left( \max_{1 \leq j \leq p} a_{i,j} \right) \geq \max_{1 \leq j \leq p} \left( \min_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} \right).$$

- 2) (*Lewis Carroll*) Soient 200 hussard rangés en 10 lignes et 20 colonnes.  
Dans chaque ligne, on prend le plus grand puis on retient le plus petit de tous ceux retenus :  $X$   
Dans chaque colonne, on prend le plus petit, puis on retient le plus grand de ceux-ci :  $Y$ .  
Qui est le plus grand ?  $X$  ou  $Y$  ?

**Exercice 32 (\*\*\*)**

On note  $E$  l'ensemble des parties non vides majorées de  $\mathbf{R}$ .

$$f : \begin{cases} (E, \subset) & \rightarrow (\mathbf{R}, \leq) \\ A & \mapsto \sup A. \end{cases}$$

- 1) Montrer que  $f$  est une fonction croissante pour les relations d'ordre choisies.  
2) Montrer qu'elle n'est pas strictement croissante.

**Exercice 33 (\*\*\*)**

Soient  $A$  et  $B$  deux parties non vides majorée de  $\mathbf{R}$ , non disjointes.

- 1) Montrer que  $\sup A \cap B \leq \min(\sup A, \sup B)$ .  
2) A-t-on l'égalité dans le cas général ?  
3) (\*\*\*) Qu'en est-il si  $A$  et  $B$  sont des intervalles ?